


**«Ուիգմոր կանանց և երեխաների հիվանդանոց»**  
Հ. Ներսիսյան 10/7, Երևան 0014,  
+374 12345678

**«Ուիգմոր ընտանիքի առողջության կենտրոն»**  
Պուշկին 56, Երևան 0002, Հայաստան  
+374 12345677

[www.wigmore.am](http://www.wigmore.am)


## ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՈՒՄ

ՀՈՒՇԱԹԵՐԹԻԿ  
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



Երեխաների մեծ մասի առաջին ատամը ծկթում է 4-6 ամսականում, սակայն մինչև 18 ամսականը առաջին ատամի ծկթումը համարվում է նորմալ: 30 ամսականում երեխաներն ունենում են բոլոր 20 կաթնատամերը:

Հազվադեպ, երեխան կարող է ծնվել ատամիկով կամ ատամը կարող է ծկթել մինչև երեք ամսականը: Այս ատամները նույնպես կազմում են ատամնաշարի մաս՝ առողջ կաթնատամներից են, եւ հեռացնել խորհուրդ չի տրվում, եթե չեն խանգարում կերակրելուն կամ շարժուն լինելու պատճառով չեն կարող պոկվել և հայտնվել շնչուղիներում:



Լնդերի ցավը մեղմելու համար կարելի է մեղմորեն մերսել նրա լնդերը. նախապես լվացեք ձեր ձեռքերը և մատներով կամ փափուկ կտորի օգնությամբ զգուշորեն մերսեք երեխայի լնդերի այտուցված հատվածները:



Կարելի է օգտագործել նաև ծկթման համար նախատեսված հատուկ սառեցված օղակները, որոնք երեխան կծում է՝ մեղմելով լնդերի ցավը:

Շատ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանը կարող է վնասել օղակի պլաստմասսան և բերել հեղուկի արտառուցքի, ուստի այդ օղակները՝


- պետք է սառեցնել սառնարանում
- չի կարելի պահել սառցարանում
- չի կարելի վարակագործել եռացող ջրում կամ սպասք լվանալու մեքենայում

Մանկաբույժի հետ խորհրդակցելով՝ ատամների ծկթումով պայմանավորված անհանգստությունը նվազեցնելու համար կարելի է պարացետամոլ (ացետամինոֆեն) և/կամ իբուպրոֆեն տալ:



Լնդերին քսվող տարբեր տեղային ցավազրկող դեղամիջոցներ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել: Նախ, դրանք շատ արագ լվացվում են թթվով և երկարատև ազդեցություն չեն կարող ապահովել, մյուս կողմից որոշ ցավազրկողներ կարող են թմրեցնել երեխայի բկանցքի լորձաթաղանթը, խանգարել երեխայի կլման ակտը և կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակներ ստեղծել:

ԻՆՉ ԱՆՏԱՆԻՇՆԵՐ ԵՆ ԴԻՏՎՈՒՄ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ



Ատամների ծկթման ժամանակ կարող են դիտվել լնդերի քոր, այտուցվածություն և ցավոտություն: Երեխան կարող է անհանգիստ լինել, որոշ դեպքերում ջերմության թեթև բարձրացում է դիտվում:

Ծնողների, իսկ երբեմն նաև բժիշկների կողմից ատամների ծկթելուն վերագրվում են նաև այլ ախտանիշներ, որոնք ոչ թե ծկթելու, այլ հիվանդության նշան կարող են լինել:

Հազը, բարձր ջերմությունը, լուծը, փսխումները, հեղուկներից կամ սննդից հրաժարվելը ատամների ծկթումով պայմանավորված չեն և այդ նշանների առկայության դեպքում պետք է դիմել բժշկի՝ դրանց իրական պատճառը պարզելու և համապատասխան բուժում իրականացնելու համար:

